

Novidades desta investigação

O estudo já está concluído. As principais conclusões incluem a descoberta de que as pessoas positivas para VIH consideravam que a malária era potencialmente mais perigosa para si, devido ao VIH. No entanto, tal não pareceu traduzir-se num maior esforço para prevenir a malária, uma vez que a doença era frequentemente considerada "inevitável".

Os nossos resultados sugerem que as recomendações dos funcionários dos serviços de saúde podem desempenhar um papel importante para encorajar os pacientes a se submeterem ao tratamento simultâneo para a malária e VIH. Na generalidade, a opinião dos pacientes foi de que a administração simultânea de fármacos para a malária e de tratamento anti-retroviral não constituiu um problema e, em geral, indicaram elevada adesão à medicação. No entanto, alguns pacientes consideraram demasiado forte o tratamento combinado, tendo indicado que tomavam os diferentes fármacos em horários diferentes, para evitar efeitos físicos negativos.

Descobrimos que a dinâmica social e material do ensaio podem ter influenciado as atitudes dos participantes face à tomada simultânea de ambos os tratamentos. O ensaio foi considerado um "projecto" que forneceu cuidados melhorados para os participantes.

Na generalidade, este estudo indica que a dinâmica entre os funcionários dos serviços de saúde, os pacientes e as condições sociais e económicas alargadas influenciam as percepções dos pacientes sobre a tomada simultânea de tratamentos para VIH e malária, assim como a adesão aos regimes de tratamento. É necessário maior apoio para ajudar as pessoas positivas para VIH a gerir os riscos percebidos relativamente à contracção da malária e encorajá-las a prevenir a infecção de malária. A gestão de casos de co-infecção pode também ser melhorada se os funcionários dos serviços de saúde comunicarem melhor com os pacientes relativamente às instruções para tomar o tratamento no contexto das suas vidas quotidianas.

Em 2012, a equipa de investigação realizou diversos eventos de divulgação e discussão com funcionários hospitalares, funcionários do ensaio e investigadores locais na região de Tanga.

- Obtenha mais informações em:

<http://www.actconsortium.org/projects/17/understanding-perceptions-of-hiv-positive-people-taking-malaria-treatment#sthash.diV7WOpO.dpuf>